

également les stéroïdes intra-articulaires. Beaucoup de conditions parentes ont comme conséquence l'installation de la chronicité dans la maladie, ainsi il n'est pas étonnant que des dommages puissent survenir sur presque tous les organes du corps humain. Par conséquent pour récupé

à SPECT peut être réalisé avant et après acétazolam

symptômes. Le patient ne doit pas être sous l'effet des antibiotiques depuis au moins six semaines avant le test, ceci pour obtenir le résultat le plus fiable.

La **capture de l'antigène** est de plus en plus courante, et peut être faite sur l'urine, le LCR, et le fluide synovial. La sensibilité est encore basse (de l'ordre de 30%), mais la spécificité est haute (de plus de 90%). Les sérums spinaux ne sont pas habituellement pas recommandés, car un sér

La *Borrelia* est reconnue pour avoir la capacité d'exister sous au moins deux, et probablement trois fo

provoquer une coloration de l'urine, des larmes et

- Thérapie immunosuppressive antérieure pendant l'i

Exemples

Permis en quantités généreuses :

Pamplemousse, citron, tomates, avocat

Permis en petites quantités seulement !

(La haute teneur en fibres de ces fruits durs et croquants compensera partiellement la carence en hydrates de carbone)

Poires, pommes, fraises, **cantaloup***, etc.

Interdits

(Ces baies ne contiennent pas assez de fibres)

Oranges, pastèques, bananes, raisins, etc.

Aucun jus de fruits non plus !

Légumes

animaux. Les meilleures périodes pour utiliser ces produits de traitement est en fin de printemps et au début de l'automne. Dans tous les cas, il est recommandé de

