

WESTERN BLOT LYME (Technique All diag)

IgM anti-P100 (B.afzelli) (5pts) . .	NEGATIF
IgM anti-VlsE (5pts) . .	NEGATIF
IgM anti-P58 (B.garinii) (4pts) . . .	NEGATIF
IgM anti-P41 (B.burgdorferi) (1pt) . . .	NEGATIF
IgM anti-P39 (B.afzelli) (4pts)	NEGATIF
IgM anti-OspA (B.afzelli) (5pts) . . .	NEGATIF
IgM anti-OspC (8pts)	NEGATIF
B.burgd.s.s. . . .	NEGATIF
B.afzelli. .	NEGATIF
B.garinii	NEGATIF
B.spielmanii	NEGATIF
IgM anti-P18 (5pts)	NEGATIF
B.burgd.s.s. . . .	NEGATIF
B.afzelli. .	NEGATIF
B.bavariensis . .	NEGATIF
B.garinii . .	NEGATIF
B.spielmanii	NEGATIF

Score IgM : 0 point(s)

IgG anti-P100 (B.afzelli) (5pts) . .	NEGATIF
IgG anti-VlsE (5pts) . .	NEGATIF
IgG anti-P58 (B.garinii) (4pts) . . .	NEGATIF
IgG anti-P41 (B.burgdorferi) (1pt) . . .	NEGATIF
IgG anti-P39 (B.afzelli) (5pts) . . .	NEGATIF
IgG anti-OspA (B.afzelli) (5pts) . . .	NEGATIF
IgG anti-OspC (5pts) . . .	NEGATIF
B.burgd.s.s. . . .	NEGATIF
B.afzelli. .	NEGATIF
B.garinii	NEGATIF
B.spielmanii	NEGATIF
IgG anti-P18 (5pts)	NEGATIF
B.burgd.s.s. . . .	NEGATIF
B.afzelli. .	NEGATIF
B.bavariensis . .	NEGATIF
B.garinii . .	NEGATIF
B.spielmanii	NEGATIF

Score IgG : 0 Point(s)

IgM ou IgG inf.ou égal à 5 pts : Ac non décelable

AC à suivre en fonction du contexte clinique et thérapeutique

